



ПСК
ФАРМА

Памятка для пациентов,
принимающих Аликсaban ПСК

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

**Материал подготовлен только
для пациентов,
принимающих Аликсaban ПСК,
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой, 2,5 мг, 5 мг
(аликсaban)**

**ВАЖНО ВСЁ ВРЕМЯ ИМЕТЬ ЭТУ КАРТОЧКУ
ПРИ СЕБЕ, ПОКА ВЫ ПРИНИМАЕТЕ
ПРЕПАРАТ АЛИКСАБАН ПСК
ПОКАЗЫВАЙТЕ ЭТУ КАРТОЧКУ
ЛЮБЫМ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВАШЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ВКЛЮЧАЯ СТОМАТОЛОГОВ, А ТАКЖЕ
ФАРМАЦЕВТАМ.**

Материал одобрен Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения (Росздравнадзор)



Карточка-напоминание для пациентов

Важно полностью прочитать листок-вкладыш с информацией для пациента, который находится в упаковке с препаратом Апиксабан ПСК (апиксабан). В нем содержатся все важные сведения, которые Вы должны знать об этом лекарстве. Попросите Вашего врача или медицинскую сестру разъяснить вам всю непонятную информацию или ответить на любые вопросы, которые у Вас могут возникнуть.

Ваш врач назначил Вам препарат Апиксабан ПСК (апиксабан).

Для того чтобы прием препарата Апиксабан ПСК был безопасен для Вас, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной здесь важной информацией.

- Если у Вас повышен риск кровотечений, сообщите об этом своему врачу перед приемом препарата.
- Не забывайте принимать Апиксабан ПСК по плану, согласно указаниям. Если Вы пропустите дозу препарата, примите ее, как только вспомните об этом, и далее продолжайте соблюдать режим приема.



- Не прекращайте прием препарата Аликсaban ПСК без предварительного обсуждения со своим врачом, поскольку у Вас повышен риск развития инсульта или других осложнений, обусловленных свертыванием крови.
- Аликсaban ПСК препятствует образованию тромбов, нарушая свертывание крови. Вместе с тем это может повышать риск развития кровотечений.
- Кровотечения могут проявляться, в частности, образованием подкожных кровоподтеков, дёгтеобразным стулом, примесью крови в моче, истечением крови из носа, головокружением, чувством усталости, бледностью или слабостью, внезапной сильной головной болью, кровохарканьем, либо рвотой кровью или рвотой содержимым, напоминающим кофейную гущу и т.д.
- В случае кровотечения, которое не проходит самостоятельно, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
- Если Вам требуется хирургическая или инвазивная процедура, проинформируйте лечащего врача о том, что Вы принимаете препарат Аликсaban ПСК.
- Прежде чем принимать какие-либо другие препараты, обсудите данный вопрос со своим лечащим врачом.



Информация для медицинских работников

Апиксабан ПСК - пероральный антикоагулянт, действующий путем прямого селективного ингибирования фактора Ха. Апиксабан ПСК может увеличить риск кровотечения. В случае серьезных кровотечений прием Апиксабан ПСК следует немедленно прекратить.

В случае хирургической или другой инвазивной процедуры прием Апиксабан ПСК необходимо прекратить заранее (подробную информацию см. в Общей характеристике лекарственного препарата).

Тесты на свертываемость крови с использованием протромбинового времени, МНО и активированного частичного тромбопластинового времени не рекомендуются для оценки антикоагулянтного эффекта препарата Апиксабан ПСК.



Информация о пациенте / пациентке
Фамилия, имя, отчество пациента / пациентки
Дата рождения
<i>Пожалуйста, попросите своего врача заполнить раздел ниже.</i>
Показания к назначению антикоагулянта
Доза препарата Апиксабан ПСК (апиксабан)
Контактная информация врача, назначившего препарат



Если Вы наблюдаете развитие нежелательных реакций у Вас, сообщите об этом лечащему врачу, фармацевту или другому медицинскому работнику.

О развитии нежелательных реакций Вы так же можете сообщить в компанию

ООО «ПСК Фарма» по:

-   - электронной почтой
rv@rusbiopharm.ru
-   - телефону горячей линии по эффективности и безопасности
(24 часа)
8 (800) 234-16-99.

Сообщайте о развитии любой нежелательной реакции, даже если она не указана в листке-вкладыше лекарственного препарата Аликсaban ПСК.