

# ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА,

принимающего препарат **Терифлуномид ПСК,**  
**таблетки, покрытые пленочной оболочкой,**  
**14 мг**

<b>ФИО пациента</b>	
<b>Дата начала приема препарата Терифлуномид ПСК</b>	
<b>Наименование медицинского учреждения</b>	
<b>ФИО лечащего врача</b>	
<b>Номер телефона лечащего врача</b>	

Эта Памятка содержит в себе информацию о важных рисках, связанных с приемом препарата **Терифлуномид ПСК.** Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата перед приемом препарата **Терифлуномид ПСК.**

Препарат **Терифлуномид ПСК** показан взрослым пациентам для лечения **рецидивирующе-ремиттирующего рассеянного склероза**.

**НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ, ЕСЛИ У ВАС РАЗВИЛИСЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СИМПТОМОВ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТА ТЕРИФЛУНОМИД ПСК:**

- Кожа или белки глаз пожелтели, потемнела моча, появилась тошнота или рвота и боли в животе. Данные симптомы могут указывать на проблемы с печенью (см. раздел **«Важная информация по безопасности»** на стр. 3).
- Высокая температура, дрожь, озноб, увеличенные лимфоузлы, уменьшенное или болезненное мочевыделение или спутанность сознания. Эти симптомы могут свидетельствовать о развитии инфекционного процесса.

**В этой Памятке указаны не все нежелательные реакции, которые могут возникнуть при применении препарата Терифлуномид ПСК. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата Терифлуномид ПСК, или проконсультируйтесь с лечащим врачом для получения дополнительной информации о нежелательных реакциях препарата Терифлуномид ПСК.**

## **| ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

### **Не принимайте препарат Терифлуномид ПСК, если Вы:**

- **имеете тяжелые нарушения функции печени.** Препарат Терифлуномид ПСК может **вызвать серьезные нарушения функции печени**, включая печеночную недостаточность, которая может быть опасной для жизни и, при тяжелом течении, может потребовать трансплантации печени. Риск развития тяжелого лекарственного поражения печени может быть выше, если у Вас уже есть заболевания печени или Вы принимаете другие лекарственные препараты, которые также оказывают токсическое действие на печень. Ваш лечащий врач назначит анализ крови на определение уровня «печеночных» трансаминаз:

- в течение 6 месяцев до начала приема препарата Терифлуномид ПСК;

- каждые 2 недели в течение 6 месяцев после начала приема препарата Терифлуномид ПСК.

Немедленно сообщите Вашему врачу, если у Вас появились какие-либо из перечисленных симптомов: тошнота, рвота, боль в животе, потеря аппетита, усталость, желтый цвет кожи и белков глаз, потемнение мочи.

- **беременны или планируете беременность, или находитесь в детородном возрасте и не используете эффективные методы контрацепции.** Препарат Терифлуномид ПСК может причинить вред Вашему будущему ребенку (см. разделы «**Применение препарата Терифлуномид ПСК во время беременности**» и «**Мужчинам, принимающим ЛП Терифлуномид ПСК**» на стр. 4 и 5).

- Если у Вас была **аллергическая реакция** на терифлуномид или лефлуномид.

## Применение препарата Терифлуномид ПСК во время беременности

- **Противопоказано** применение терифлуномида во время беременности или у женщин детородного возраста, которые не используют надежные методы контрацепции, так как терифлуномид может вызывать **серьезные врожденные пороки развития**.

- **Женщинам детородного возраста, принимающим препарат Терифлуномид ПСК**, следует сделать тест на беременность, прежде чем начать прием препарата.

- **При приеме препарата Терифлуномид ПСК следует применять эффективные методы контрацепции на протяжении всего курса лечения препаратом, а также после прекращения курса до тех пор, пока Вы не сделаете анализы крови, чтобы убедиться, что уровень терифлуномида в крови достаточно низок.**

- Если Вы забеременели во время приема препарата Терифлуномид ПСК или в течение 2 лет после прекращения его приема, немедленно сообщите об этом своему врачу.

## Мужчинам, принимающим препарат Терифлуномид ПСК:

- Если **Ваша партнерша планирует забеременеть**, Вы должны **прекратить прием Терифлуномид ПСК** и узнать у Вашего лечащего врача о сроках выведения препарата Терифлуномид ПСК из организма.

- Вы и Ваша партнерша **должны использовать эффективные противозачаточные средства** во время лечения препаратом Терифлуномид ПСК, а также продолжать использовать эффективные противозачаточные средства до тех пор, пока не будет проверен уровень терифлуномида в крови, и он не станет достаточно низким. Препарат Терифлуномид ПСК может оставаться в крови до 2 лет после прекращения его приема. Ваш лечащий врач может назначить лекарство, которое поможет быстрее снизить уровень препарата Терифлуномид ПСК в крови. Обратитесь к своему лечащему врачу, если Вам нужна дополнительная информация.

## **Перед приемом препарата Терифлуномид ПСК проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:**

- у Вас заболевания печени или почек;
  - у Вас лихорадка, инфекция, или иммунодефицит;
  - Вы ощущаете онемение или покалывание в руках или ногах, которые отличаются от симптомов рассеянного склероза;
  - Вы страдаете сахарным диабетом;
  - у Вас развивались серьезные кожные реакции при приеме других лекарственных препаратов;
  - у Вас высокое артериальное давление;
  - Вы кормите грудью или планируете кормить грудью (неизвестно, проникает ли терифлуномид в грудное молоко).
- Применение препарата Терифлуномид ПСК противопоказано в период грудного вскармливания.**

### ***Важно!***

Расскажите своему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые Вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные препараты, витамины и биологически активные добавки.





Одновременное использование препарата Терифлуномид ПСК с другими лекарственными препаратами может влиять на метаболизм препаратов в организме и их действие, вызывая серьезные нежелательные реакции. Препарат Терифлуномид ПСК может влиять на действие других лекарственных препаратов, точно также другие лекарственные препараты могут влиять на действие Терифлуномид ПСК.

**Пожалуйста, ознакомьтесь с листком–вкладышем по  
медицинскому применению препарата  
Терифлуномид ПСК на сайте [grls.rosminzdrav.ru](http://grls.rosminzdrav.ru)  
(Государственный реестр лекарственных средств)  
для получения дополнительной информации**

Если у Вас остались какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с  
лечащим врачом или другим медицинским сотрудником.

**Если Вы наблюдаете у себя развитие нежелательных  
реакций, сообщите об этом лечащему врачу, фармацевту или  
другому медицинскому работнику.**

**О развитии нежелательных реакций Вы так же можете  
сообщить в компанию ООО «ПСК Фарма» по:**

  - электронной почте [pv@rusbiopharm.ru](mailto:pv@rusbiopharm.ru)  
  - телефону горячей линии по эффективности и  
безопасности (24 часа) [8 \(800\) 234-16-99](tel:88002341699).

**Сообщайте о развитии любой нежелательной реакции, даже  
если она не указана в листке–вкладыше по медицинскому  
применению препарата Терифлуномид ПСК.**