

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

РИВИЯ®

(этанерцепт)

раствор для подкожного введения,

50 мг/мл

Эта Памятка содержит в себе выборочную важную информацию по безопасности препарата Ривия® , с которой необходимо ознакомиться перед началом его применения.

Если у Вас остались вопросы после прочтения этой Памятки, пожалуйста, проконсультируйтесь с лечащим врачом.



Перед началом терапии препаратом Ривия® внимательно ознакомьтесь с его инструкцией по медицинскому применению

- Показывайте эту Памятку любому врачу или медицинскому работнику, к которому Вы или Ваш ребенок (если препарат назначен ему) обращаетесь.
- Держите при себе эту Памятку в течение 2 месяцев после завершения применения препарата Ривия®, так как побочные эффекты могут возникнуть после введения последней дозы препарата.

В этой Памятке указаны не все нежелательные реакции препарата Ривия®

- Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата Ривия®, или проконсультируйтесь с лечащим врачом для получения дополнительной информации о нежелательных реакциях препарата Ривия®.

Пожалуйста, запишите торговое наименование и номер серии препарата Ривия® , который принимаете Вы или Ваш ребенок:

Торговое

наименование:

Номер серии:

Инфекции

При применении препарата Ривия® может повышаться риск развития инфекций, некоторые из них могут быть серьезными.

- Прием препарата Ривия® противопоказан при активных инфекциях, включая хронические или локализованные инфекции, а также в случае инфекции крови (сепсиса) или риска возникновения сепсиса.
- Если у Вас или Вашего ребенка развивается инфекция или в прошлом были частые или длительные инфекции, сообщите об этом врачу, так как, вероятно, потребуется дополнительный контроль в ходе лечения препаратом Ривия®.
- Если у Вас или Вашего ребенка появились симптомы, указывающие на развитие инфекции, такие как повышенная температура тела, постоянный кашель, потеря веса или вялость, немедленно обратитесь к врачу.
- Если Вы или Ваш ребенок когда-либо болели туберкулезом или находились в тесном контакте с человеком, больным туберкулезом, перед лечением препаратом Ривия® могут потребоваться дополнительные обследования. Также если во время или после терапии у Вас или Вашего ребенка появляются симптомы туберкулеза (например, постоянный кашель, потеря веса, вялость, потливость, лихорадка) немедленно сообщите об этом врачу.

- Попросите лечащего врача записать даты проведения и результаты последнего обследования на туберкулез ниже:

**Диагностическая
процедура:**

Дата:

Результаты:

**Диагностическая
процедура:**

Дата:

Результаты:

Пожалуйста, попросите лечащего врача записать наименования других принимаемых Вами или Вашим ребенком препаратов, которые могут повысить риск развития инфекций:

Хроническая сердечная недостаточность

- Если у Вас или Вашего ребенка появились симптомы, указывающие на развитие или ухудшение хронической сердечной недостаточности, такие как одышка, отек лодыжек, постоянный кашель или усталость, немедленно обратитесь к врачу.

Другая информация (заполните, пожалуйста)

ФИО пациента: _____

ФИО врача: _____

Контакты врача: _____

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению препарата Ривия®

на сайте grls.rosminzdrav.ru





(Государственный реестр лекарственных средств)

для получения дополнительной информации.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с лечащим врачом или другим медицинским сотрудником.

Если Вы наблюдаете развитие нежелательных реакций у Вас или у Вашего ребенка, сообщите об этом лечащему врачу, фармацевту или другому медицинскому работнику.

О развитии нежелательных реакций Вы так же можете сообщить в компанию ООО «ПСК Фарма» по:

  - электронной почте pv@rusbiopharm.ru
  - телефону горячей линии по эффективности и безопасности (24 часа) [8 \(800\) 234-16-99](tel:8(800)234-16-99).

Сообщайте о развитии любой нежелательной реакции, даже если она не указана в инструкции по медицинскому применению препарата Ривия®.